

Paciente...: **JOSE CARLOS SIMOES**
Cod.Ficha.: **0124327**
Nascimento.: **04-07-1956 - 63 Anos 10 Meses 28 Dias**
Dr(a).....: **1 - MEDICO NAO INFORMADO**

Local....: **VIEP MUCURI**
Convênio.: **LABORATORIO SAO JOSE**
Data.....: **01/06/2020**

TESTE RÁPIDO COVID-19-SARS-COV-2

MÉTODO: IMUNOCROMATOGRÁFICO

Lote **202005003**

Validade **05/11/2020**



IgM RESULTADO:NÃO REAGENTE

IgG RESULTADO:NÃO REAGENTE

VALORES DE REFERÊNCIA: NÃO REAGENTE / NEGATIVO

OBS.: EXAME REPETIDO E CONFIRMADO

NOTA: Um resultado não reagente para anticorpos anti-SARS-CoV-2 não exclui a COVID-19 e não deve ser utilizado isoladamente para a suspensão do isolamento domiciliar. Resultados não reagentes podem ocorrer em pacientes assintomáticos ou sintomáticos com SARS-CoV-2 detectado no exame de RT-PCR em qualquer momento durante a evolução da infecção, principalmente, mas não exclusivamente, nos primeiros 10 dias do início dos sintomas. Este exame não deve ser utilizado para avaliação de pacientes com sintomas respiratórios agudos. RT-PCR para SARS-CoV-2 e painel para vírus respiratórios são os métodos laboratoriais indicados nesse contexto. No contexto clínico-epidemiológico apropriado, a detecção de anticorpos anti-SARS-CoV2 ou demonstração de soroconversão pode indicar contato com o vírus, mas não necessariamente infecção e/ou transmissão atual. Portanto, resultados reagentes em exames sorológicos não podem ser usados como evidência absoluta da COVID19, devendo ser interpretado por um médico com auxílio de dados clínicos e de outros exames laboratoriais. A interpretação do resultado, como qualquer outro exame laboratorial, é de responsabilidade do médico assistente. Até o presente momento, não há comprovação de que o surgimento de anticorpos IgG após a infecção esteja associado com o desenvolvimento de imunidade e interrupção da transmissão do SARSCoV2. Resultados reagentes para anticorpos anti-SARS-CoV2, com índices < 2,0, foram observados em amostras com anticorpos IgM e IgG anti-EBV, anti-CMV, anti-Dengue e anti Mycoplasma pneumoniae, podendo indicar, assim, reação cruzada ou interferência por anticorpos heterófilos.


Dr. Heron de Moura Lopes Freitas
Bioquímico CRF/BA: 2660
Dr. Cledson José de Assis
Bioquímico CRF/BA: 3989